

MYŚLIWY

PAMIĘTAJ!!!

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.

**Podjejrzasz ASF ?
znalazłeś padłego
dzika ?
ZADZWOŃ!**



Pieczętka
PIW z numerem
telefonu

**INFORMACJA
DLA MYŚLIWYCH
AFRYKAŃSKI
POMÓR ŚWIŃ**



Inspekcja Weterynaryjna

!!! MYŚLIWI !!!

!!! ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ !!!!

Jesteś myśliwym?

Polując zwracaj uwagę na zachowanie zwierząt dzikich, a w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF), w szczególności na zachowanie dzików!

Afrykański pomór świń to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzików, podlegająca obowiązkowi urzędowego zwalczania.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF

Wystąpienie tej choroby powoduje poważne straty ekonomiczne w przemyśle mięsny oraz hodowli - powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.

!!! Jesteś myśliwym hodującym świnie?!

Nie kuś losu, nie poluj !!!

Po zauważeniu u dzików objawów wskazujących na chorobę, takich jak:

- zwiększone padnięcia;
- osłabienie, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki;
- sinica skóry uszu, brzucha, i boków ciała, liczne wybroczyny na skórze;
- duszność, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
- biegunka, często z domieszką krwi;

oraz, każdy przypadek znalezienia padłego dzika

zglaszaj ten fakt do najbliższego powiatowego lekarza weterynarii!!

Zachowaj daleko idącą ostrożność w postępowaniu z odstrzelonym lub padłym dzikiem:

- nie patrosz padłego lub odstrzelonego dzika, który wykazywał objawy choroby w łowisku;
- unikaj patroszenia wszystkich odstrzelonych dzików w łowisku, staraj się jak najszybciej przewieźć je do punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;

- jeżeli patroszenie jest niezbędne wykonaj je na folii, lub innym szczelnym materiale;
- podczas każdego polowania używaj środka biobójczego do dezynfekcji miejsca patroszenia, a także miejsc zanieczyszczonych krwią dzika (np. w trakcie przeciągania tuszy dzika do środka transportu itp.);
- umieszczaj patrochy i folię, na której dokonano patroszenia w szczelnym pojemniku lub worku;
- po wykonaniu wszystkich czynności na zwierzętach w łowisku zdezynfekuj sprzęt, którego używałeś do tego celu, zdezynfekuj koła środka transportu, dłonie, obuwie, itp.

Zwróć szczególną uwagę na odpowiednie przygotowanie środka transportu używanego po przewożenia odstrzelonych dzików, a mianowicie:

- środek transportu powinien być szczelny, wyłożony materiałem łatwym do czyszczenia i dezynfekcji;
- nie powinien być używany w działalności związanej z utrzymaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;